



FORMATS DISPONIBLES
1,5kg - 3kg

RECOMMANDÉ POUR*:

- Dissolution des calculs de struvite (5 à 12 semaines)

AUTRES UTILISATIONS :

- Réduction de la formation d'oxalates de calcium

NON RECOMMANDÉ EN CAS DE :

- Croissance
- Gestation et lactation
- Insuffisance rénale chronique(IRC)
- Insuffisance cardiaque

* Règlement (UE) 2020/354



CONSTITUANTS ANALYTIQUES

(par rapport à la matière brute)

• Humidité	5,5 %
• Protéines	44 %
• Protéines animales / végétales	90/10
• Matières grasses	16 %
• Matières minérales	7,5 %
• Cellulose brute	4 %
• ENA*	23 %
• Amidon	15 %
• Calcium	0,65 %
• Phosphore	0,65 %
• Sodium	1,3 %
• Potassium	0,7 %
• Magnésium	0,08 %
• Chlorure	1,8 %
• Soufre	0,7 %
• Méthionine + Cystéine	1,5 %
• Oméga-6	2,5 %
• Oméga-3	1 %
• EPA+DHA	0,3 %

VALEURS NUTRITIONNELLES

• EM** calculée (NRC 2006)	397 kcal/100g
• EM** mesurée <i>in vivo</i>	385 kcal/100g
• Ratio protido-calorique (NRC 2006)	111 g/Mcal
• Digestibilité des protéines	87 %
• Digestibilité des matières grasses	96 %
• Énergie par les protéines	42 %
• Énergie par les matières grasses	37 %
• Énergie par l'ENA*	21 %

* Extractif non azoté

** Énergie métabolisable

PAUVRE EN GLUCIDES (ENA) 23%

RICHE EN PROTEINES 44%

dont **90%** d'origine animale

COMPOSITION

Protéines déshydratées de porc et volailles, fécule de pommes de terre, protéines hydrolysées de porc et volailles, graisses animales, substances minérales, pois, coques de fèves, riz, pulpe de betterave, graine de lin, levure de bière, huile de poissons, lignocellulose, fibre de psyllium (*Plantago (L.) spp.*), fructo-oligosaccharides, hydrolysate de crustacé (source de chitosan), sulfate de chondroïtine, *Lactobacillus acidophilus*.

INGRÉDIENTS/ADDITIFS SPÉCIFIQUES

• Bentonite	5 g/kg
• Lactobacilles tués	7 mg/kg
• Chitosan	800 mg/kg
• L-carnitine	540 mg/kg
• Citrate de potassium	0,3 %

RATION QUOTIDIENNE (g/jour)

Poids (kg)	Age (mois)		
	Embonpoint	Normal*	Maigre
2	20	20	25
3	30	35	35
4	40	45	50
5	50	55	60
6	60	65	75
7	70	75	85
8	75	85	95
9	85	100	110
10	95	110	120

La ration quotidienne est calculée sur la base du poids ACTUEL du chat et doit être ajustée tous les mois.

Convient à partir de l'âge de 6 mois.

* Chat adulte stérilisé vivant à l'intérieur, de poids optimal



